



Afplattung schedel (Pagiocephalie)

Plagiocéphalie fronto-occipitale



Plagiocéphalie occipitale



Platycéphalie



Fysio De Kolk
Sociaal Medisch Centrum De Kolk
E.G.M. Bos en R.H.F. Eggink
Zuideinde 80
1511 GH Oostzaan
Telefoon: 075-684 5573
E-mail: info@fysiodekolk.nl



Afplatting schedel of plagiocephalie

Baby's kunnen in de loop van de eerste maanden een afgeplatte schedel ontwikkelen door een voorkeurshouding. Bij een voorkeurshouding ligt de baby teveel naar 1 kant gedraaid of voortdurend op de rug. Zeker nu wordt geadviseerd om baby's op de rug te laten slapen ter voorkoming van Wiegedood, komt afplatting wat vaker voor. Doordat de schedel nog erg vervormbaar is kan dit leiden tot afplatting. Een scheve afplatting wordt plagiocephalie genoemd.

Bij een te grote afplatting zal worden verwezen naar een specialist voor het beoordelen van eventueel helmtherapie (redressietherapie) . Meestal gebeurt dit rond de vijfde of zesde levensmaand als blijkt dat de afplatting voor de ouders (esthetisch) niet aanvaardbaar is. Ook als bij 5 maanden de afplatting nog tenminste 108-110 cm is wordt helmtherapie geadviseerd.

Meestal is helmtherapie niet nodig, en kan ik volstaan met adviezen over hantering, houding en slaaphouding van uw baby. De therapie bestaat dan ook uit instructie, oefening in de praktijk, en desgewenst bij u thuis. Tevens kijk ik naar de motorische ontwikkeling van uw baby omdat een voorkeurshouding kan leiden tot haperingen in de normale motorische ontwikkeling. Ook hierbij spelen adviezen een belangrijke rol.

Als kinderfysiotherapeut beoordeel ik de mate van afplatting, en of dit gevolgen heeft voor de vorm van het gezicht, bijvoorbeeld asymmetrische stand van wangen, oren en ogen.

Lieke Bos, Kinderfysiotherapeut

